

Les risques de la consommation d'alcool du projet de conception aux premiers mois de la vie.

Matériels nécessaires et organisation pour un groupe de 40 élèves :

- vidéo 2 : « Interview du professeur Roy Doray Bérénice »

(PU-PH en GENETIQUE / Doyenne de la Faculté de Santé de La Réunion UR / Chargée de Mission Prévention et Promotion de la Santé UR / Directrice du Centre Ressources TSAF de La Réunion).


Répartir les élèves par groupe de 4 soit 10 groupes de 4 élèves

10 feuilles format A4 des documents 1,2,3 (sous transparent)

40 feuilles A4 page avec consignes.


Stylos vert

Vidéo 2 + ordinateur + vidéoprojecteur




Document 1 : Fœtus de 9 semaines dans l'organisme maternel Document 2 : Placenta humain


Document 3 : Périodes de développement des différents organes et sensibilité correspondant aux effets d'une exposition à l'alcool.




Conception



Grossesse



Allaitement



RISQUES SAF ou TSAF ?		
0 mois	3 mois	9 mois
A	B	

Questions : à l'aide de la vidéo et des documents 1, 2, 3, répondre aux questions ci-dessous :

- Qu'est ce qu'un SAF ?
- Qu'est ce qu'un TSAF ?
- Sur le schéma ci-dessus, replacez, en vert, le trajet de l'alcool.
- Complétez les deux parties, avant et après la grossesse, en indiquant où se situe le risque de TSAF ou SAF.
- Sous le schéma, dans les cases A et B, indiquez le risque de SAF ou de TSAF, selon le moment de la grossesse, en nommant les organes impactés.

Correction :

- SAF : syndrome d'alcoolisation fœtale. Forme complète qui touche physique et psychique. 1/1000

TSAF : trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale ou TNDLA, handicap invisible, atteinte psychique. 1/100

- Repasser en vert le sang maternel arrivant au placenta, le sang fœtal arrivant au fœtus via le cordon, le sang fœtal, le liquide amniotique.
-

